

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	CBDCA+PTX	ビタミン5錠内服。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：180mg/m ² Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
11	CBDCA+PTX+Bevacizumab	ビタミン5錠内服。アバスタブの投与時間は2回目60分，3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし)：15mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：180mg/m ² Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1

12	Weekly PTX+ CBDCA + RT	以テ5錠内服。治療終了後、引き続きPTX(200mg/m ²) + CBDCA (AUC5) day1のみ投与を2コース施行。	36	6	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :40mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
20	CBDCA + PEM	投与7日前にメトホルミル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパンビタ1g内服 (連日服用) 。	1	20	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1</p> <p>アリムタ注射用 (規格なし) :500mg/m² Day1</p> <p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1</p> <p>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p>
21	CBDCA + PEM + Bevacizumab	投与7日前にメトホルミル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , 投与7日前よりパンビタ1g内服 (連日服用) 。	1	20	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1</p> <p>アリムタ注射用 (規格なし) :500mg/m² Day1</p> <p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1</p> <p>カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p> <p>アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p>

30	CBDCA + DOC		1	27	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60mg/m² Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
40	CBDCA + GEM		8	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8</p>
50	CBDCA + CPT-11		15	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし) :50mg/m² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
60	CBDCA + VNR		8	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 (規格なし) :20mg/m² Day1 Day8 生食 (100mL) :1瓶 Day8</p>

70	CBDCA + S1	ティ-エソロンはday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
80	CBDCA + VP16		3	25	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3 イトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）:100mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
90	CBDCA + AMR		3	25	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生食（20mL）:1管 Day1 Day2 Day3 カルセド注射用（規格なし）:35mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
100	CBDCA + nab-PTX		15	13	<p>生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキン静注0.75mg（5mL）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1</p>

210	CDDP+DOC	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	3	18 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :60m g /m Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g /m Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (5 0 0 m L):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1
220	CDDP+PEM	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。投与7日前にメトホルミル注1mg筋注, 投与7日前よりア°ビ°タト1g内服	3	18 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :75m g /m Day1 20%マンニトール注射液「Y D」(300mL袋) :1袋 Day1 アリムタ注射用 (規格なし) :500m g /m Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 ソルデム3A輸液 (5 0 0 m L):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1

221	CDDP+PEM (NSCLC) (ショートハイドレーション)	ア°ル°タ°ト(day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。投与7日前にメチコパ°ル注1mg筋注, 投与7日前よりア°ル°タ°ト1g内服。	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :75mg/m ² Day1 アリムタ注射用 (規格なし) :500mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「ルキ」 (10mL) :1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200mL Day1
230	CDDP+GEM	ア°ル°タ°ト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	8	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :100mg/m ² Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1

240	CDDP+CPT-11 (NSCLC)	ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :60mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>
241	CDDP+CPT-11 (NSCLC放射線併用)	ア°比°タ°ト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :50mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day15 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g /m² Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>

242	CDDP+CPT-11 (SCLC)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	15	<p>13</p> <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :60mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg /m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p>
243	CDDP+CPT-11 (SCLC放射線併用)	ア°比°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	15	<p>13</p> <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :40mg /m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg /m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1</p>

244	CDDP+CPT-11 (NSCLC) (ショートハイドレーション)	アピタント (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3)	15	<p>13</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60mg g /m³ Day8 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 アロキシ静注 0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg g /m³ Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「アル」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15</p>
-----	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

245	CDDP+CPT-11 (SCLC) (ショートハイドレーション)	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給推奨 (day1~3)	15	<p>13</p> <p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60m g /m³ Day8 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day15 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60m g /m³ Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day15</p>
250	CDDP+VNR	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	8	<p>20</p> <p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day8 Day1 ロゼウス静注液 (規格なし) :25m g /m³ Day8 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (5 0 0 m L) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80m g /m³ Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1</p>

260	CDDP+S1（放射線同時併用）	ア°ビ°タト（day1：125mg，day2～3：80mg）併用。アイソンはday1～14経口投与（2週投与2週休薬）。	3	25	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1
261	CDDP+S1（NSCLC）（ショートハイドレーション）	ア°ビ°タト（day8：125mg，day9,10：80mg）併用。アイソンはday1～21経口投与。追加経口摂取1000mL/day（day8～10）	1	34	生食（100mL瓶）：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：200mL Day1 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 ソルデム1輸液（500mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「リキ」（10mL）：1キット Day1

270	CDDP+VP16 (ショートハイドレーション)	ア°ビ°タト(day1 : 125mg, day2,3 : 80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	3	25	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」 (5mL瓶) :100mg /m³ Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg /m³ Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 (10mL) :1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3</p>
271	CDDP+VP-16	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	3	18	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :80mg /m³ Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」 (5mL瓶) :100mg /m³ Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day2 Day3</p>
610	Nivolumab (q2w)		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1</p>

620	Nivolumab (q4w)		1	27	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :2瓶 Day1
630	Pembrolizumab (q3w)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1
631	Pembrolizumab+ CBDCA+PTX (導入)	ルット確保時、レスタミン5錠内服。アプレビタント (day1:125mg,day2,3:80mg) 併用。4コース後、維持 (Pembrolizumab) へ。	1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :200mg/㎡ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1
632	Pembrolizumab+ CBDCA+PEM (導入)	マコバル注1mg筋注 (3コース毎に1回程度) , パンビタント1g (連日服用) 。アプレビタント併用。4コース後、維持 (Pembro+PEM)	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg (100mg/4mL) :200mg Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アリムタ注射用 (規格なし) :500mg/㎡ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1

633	Pembrolizumab+PEM (維持)	投与7日前にマコパール注1mg筋注(3コース毎に1回程度), 投与7日前よりペンビタン1g内服(連日服用)。	1	20	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m ² Day1
640	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1
650	Atezolizumab	初回60分かけて投与し, 忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL):1200mg Day1
651	Atezolizumab+Bevacizumab+ CBDCA+ PTX (維持)	アバスチン終了後、イマチニブ5錠内服。アテゾリズマブ(125mg, day1, 2, 3:80mg)併用。4-6コース終了後、維持(Atezo+Beva)。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):200mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1
652	Atezolizumab+Bevacizumab (維持)		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1

653	Atezolizumab+CBDCA+VP-16 (導入)	アテゾリズマブ (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4コース終了後、維持 (Atezolizumab)。	3	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食 (500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトポシド点滴静注液100mg「サト」 (5mL瓶):100mg/m² Day1 Day2 Day3 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
654	Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX (導入)	アテゾリズマブ (day1:125mg,day2-3:80mg) 併用。4又は6コース終了後、維持 (Atezolizumab)。	15	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 アプラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m² Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1</p>
655	Atezolizumab+CBDCA+PEM (導入)	メトホルム1mg筋注 (9週毎に1回), パンビタリ1g (連日服用)。アテゾリズマブ併用。4又は6コース後、維持 (Atezo+PEM)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食 (100mL):1瓶 Day1 アリムタ注射用 (規格なし):500mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし):0mg/A Day1</p>

656	Atezolizumab + PEM (維持)	投与7日前までにオシメル注1mg筋注(9週毎に1回), 投与7日以上前よりポンビタ1g内服(連日服用)。	1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m ² Day1
670	Durvalumab		1	13	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1
410	DOC		1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
420	PEM	投与7日前にオシメル注1mg筋注(3コース毎に1回程度), 投与7日前よりポンビタ1g内服(連日服用)。	1	20	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m ² Day1
430	GEM		15	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day15 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8

440	Weekly CPT-11	1週間毎に3~4回投与し、少なくとも2週間休薬。	1	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし):100mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
450	VNR		8	13	<p>生食(100mL):1瓶 Day8 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day1 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m² Day8 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day1</p>
460	AMR		3	18	<p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day3 Day1 Day2 カルセド注射用(規格なし):45mg/m² Day3 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day3 Day1 Day2 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
470	Topotecan		5	16	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生食(100mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/m² Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>

480	CPT-11 + PTX	ビタミン5錠内服。	15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) :50mg/m² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :180mg/m² Day1</p>
490	CPT-11 + GEM		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day8 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) :100mg/m² Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day8 Day1</p>
500	GEM + VNR		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 (規格なし) :25mg/m² Day1 Day8</p>

510	Bevacizumab (maintenance)	アバスタチンは2回目60分, 3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
520	nab-PTX (weekly)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
530	DOC + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	1	20	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :60mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1