

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
310	Trastuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8m g/kg Day1
311	Trastuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6m g/kg Day1
330	Weekly PTX+Trastuzumab (初回)	ビタミン5錠内服。	1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :80m g/m ² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.19m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :4m g/kg Day1
331	Weekly PTX+Trastuzumab (2回目以降)	ビタミン5錠内服。	1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :80m g/m ² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.095m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :2m g/kg Day1

340	nab-PTX+Trastuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8mg/kg Day1
341	nab-PTX+Trastuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6mg/kg Day1
342	(デキサートあり)nab-PTX+Trastuzumab (初回)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
343	(デキサートあり)nab-PTX+Trastuzumab (2回目以降)		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1

350	GT + Weekly Trastuzumab (1回-7日目)	ビタミン5錠内服。	15	6	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 パクリタキセル注「ネビテラ」(規格なし) :80mg/m² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1250mg/m² Day1 Day8 注射用水 (20mL管) :0.19mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :4mg/kg Day1 注射用水 (20mL管) :0.095mL/kg Day8 Day15 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :2mg/kg Day8 Day15</p>
351	GT + Weekly Trastuzumab (2回-7日目以降)	ビタミン5錠内服。	15	6	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 パクリタキセル注「ネビテラ」(規格なし) :80mg/m² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1250mg/m² Day1 Day8 注射用水 (20mL管) :0.095mL/kg Day1 Day8 Day15 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :2mg/kg Day1 Day8 Day15</p>
362	TC75 + Trastuzumab (初回)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1</p>

363	TC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1</p>
372	DOC75 + Trastuzumab (初回)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1</p>
373	DOC75 + Trastuzumab (2回目以降)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1</p>
382	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>

383	DOC75 + Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1</p>
384	Trastuzumab + Pertuzumab (初回)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :8mg/kg Day1 パージエタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>
385	Trastuzumab + Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」(規格なし) :6mg/kg Day1 パージエタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1</p>
390	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine)	初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p>
400	T-DM1 (Trastuzumab Emtansine) (術後：上)	初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。上限14コース。	1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 カドサイラ点滴静注用 (規格なし) :3.6mg/kg Day1</p>

410	Trastuzumab deruxtecan	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。初回90分, 忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4m g /kg Day1
20	EC100	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注 (規格なし) :100mg /m ³ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg /m ³ Day1
21	EC60	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注 (規格なし) :60mg /m ³ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg /m ³ Day1

22	dose dense EC90	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 塩酸エビルピシン注 (規格なし) :90m g /m³ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサソ 5 0 0 mg:600m g /m³ Day1</p>
30	FEC100	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 塩酸エビルピシン注 (規格なし) :100m g /m³ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサソ 5 0 0 mg:500m g /m³ Day1 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「ト-7」:500m g /m³ Day1</p>
40	Weekly PTX	ビタミン5錠内服。	1	6	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピ-ラ」 (規格なし) :80m g /m³ Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p>

41	Weekly PTX + Bevacizumab	レスタミン錠内服。アバスタチンの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	15	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg/m² Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15</p>
42	dose dense PTX	2週毎、4コース行う。フィルター付き輸液セットを使用する。レスタミン錠内服。	1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :175mg/m² Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p>
50	クラシカルCMF	イントレオン100mg/m ² (day1~14) 経口投与。	8	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 注射用メトトレキサート (規格なし) :40mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「トール」:600mg/m² Day1 Day8</p>
61	DOC75		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :75mg/m² Day1</p>

70	VNR		8	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液 (規格なし) :25m g /m³ Day1 Day8</p>
80	GEM		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし) :1250m g /m³ Day1 Day8</p>
91	TC75 (Docetaxel + Cyclophosphamide)		1	20	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :75m g /m³ Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 注射用エンドキサン5 0 0 mg:600m g /m³ Day1</p>
100	GT (GEM + PTX)	以タミン5錠内服。	8	13	<p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :80m g /m³ Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし) :1250m g /m³ Day1 Day8</p>

110	nab-PTX		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1
111	(デキサーあり)nab-PTX		1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1 デキサー注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1
120	Eriburin		8	13	生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m ² Day1 Day8 デキサー注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8
130	Atezolizumab + nab-PTX	テセントリクは初回60分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	15	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 テセントリク点滴静注840mg（14mL瓶）：1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）：1瓶 Day8 Day15 生食（100mL瓶）：1瓶 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m ² Day8 Day15