

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	S1+CDDP	テイ-イスワンは80mg/m ² をday1～21経口投与（3週投与2週休薬）。アプロピタト（day8～10）併用。	3	32	ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキン静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m ² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1
12	S1+DOC	テイ-イスワンは80mg/m ² をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
12.1	DOC		1	20	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」（規格なし）：60mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1

15	Weekly PTX	ビタミン5錠内服。	15	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
27	nab-PTX		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m² Day1</p>
42	CapeOX	カペシタビンは2000mg/m ² をday1の夕からday15の朝まで内服 (2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
43	SOX	サイタキセルは80mg/m ² をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>

44	Weekly PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注用 (規格なし):8mg/kg Day1 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
45	Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用 (規格なし):8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
46	Weekly nab-PTX+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分, 2回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg:1管 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注用 (規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15</p>

53	mFOLFOX6		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」（規格なし）：200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：85mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：400mg/m ² Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッ°チップ°）：1筒 Day1
48-1	Nivolumab（q2w）		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：1瓶 Day1
48-2	Nivolumab（q4w）		1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：2瓶 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1
20	Trastuzumab（初回）	胃癌に対しては、ハーセプ°チン単剤での投与不可（他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：8mg/kg Day1
21	Trastuzumab（2回目以降）	胃癌に対しては、ハーセプ°チン単剤での投与不可（他の抗悪性腫瘍剤との併用が必要）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：6mg/kg Day1

54	Trastuzumab deruxtecan	アプロチクトは主治医判断。初回90分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	ブドウ糖注射液5% (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキン静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4m g /kg Day1
29	CPT-11 + Trastuzumab (初回)	CPT-11は2週毎投与, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :8m g/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :150m g/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1
30	CPT-11	2週毎投与。	1	0	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :150m g/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1
31	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイバー」 (規格なし) :6m g/kg Day1

32	CPT-11 + Trastuzumab (2回目以降)	CPT-11は2週毎投与, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :6m g/kg Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」 (規格なし) :150m g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 m L :1瓶 Day1</p>
49	mFOLFOX6 + Trastuzumab (初回)	mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	<p>生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0. 7 5 m g (5m L) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トー」 (規格なし) :200m g/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85m g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」 5 0 m L :1瓶 Day1 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「トー」:400m g/m² Day1 フルオロウラシル注 1 0 0 0 mg「トー」:2400m g/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」 1 0 m L (スリッパチップ) :1筒 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイザー」 (規格なし) :8m g/kg Day1</p>

50	mFOLFOX6 (Trastuzumab併用)	mFOLFOX6 は2週ごと、 Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	6	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」 (規格なし) :200mg/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1</p>
51	Trastuzumab (2回目以降)	胃癌：ルセツ [®] 単剤での投与不可（他の抗悪性腫瘍剤と併用）。mFOLFOX6 は2週ごと、Trastuzumabは3週ごと。	1	6	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイダー」 (規格なし) :6mg/kg Day1</p>
52	mFOLFOX6 + Trastuzumab (2回目以降)	mFOLFOX6 は2週ごと、 Trastuzumab は3週ごとに投与する。	1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-」 (規格なし) :200mg/m² Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m² Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285mL/kg Day1 トラスツズマブ B S 点滴静注用「ファイダー」 (規格なし) :6mg/kg Day1</p>

40	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	<p>ファイソワは80mg/m²をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。アプロタクト(day1~3)併用。</p>	3	18	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1</p>
41	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	<p>ファイソワは80mg/m²をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。アプロタクト(day1~3)併用。</p>	3	18	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>

18	Trastuzumab (初回) + S1 + CDDP	<p>ティ-イスワンは80mg/m²をday1~21経口投与(3週投与2週休薬)。ア°レ°タト(day8~10)併用。</p>	3	1	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 ハーセプチン注射用(規格なし):8mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>
19	Trastuzumab (2回目以降) + S1 + CDDP	<p>ティ-イスワンは80mg/m²をday1~21経口投与(3週投与2週休薬)。ア°レ°タト(day8~10)併用。</p>	3	1	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイバー」(規格なし):6mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>

22	S1+CDDP	ティーエスワは80mg/m ² をday1～21経口投与（3週投与2週休薬）。アプロビタト（day8～10）併用。	3	1	<p>ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リソ酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 生食（500mL）：1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注（規格なし）：60mg/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day1</p>
23	Trastuzumab（初回）	3週毎投与。	1	0	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：8mg/kg Day1</p>
24	Trastuzumab（2回目以降）	3週毎投与。	1	0	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：6mg/kg Day1</p>
46	SOX+Trastuzumab（初回）	ティーエスワは80mg/m ² をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用水（20mL管）：0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（規格なし）：8mg/kg Day1</p>

47	SOX + Trastuzumab (2回目以降)	ファイソは80mg/m ² をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1</p>
36	Weekly PTX + Trastuzumab (初回)	以タミン5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 パクリタキセル注「ホシ」(規格なし):80mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
37	Weekly PTX	以タミン5錠内服。3週投与1週休薬。	1	0	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホシ」(規格なし):80mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
38	Trastuzumab (2回目以降)	3週毎投与。	1	0	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブB S点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1</p>

39	Weekly PTX+Trastuzumab (2回目以降)	ワタシ5錠内服。PTXは3週投与1週休薬, Trastuzumabは3週毎投与。	1	0	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL管) :0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイバー」(規格なし) :6m g/kg Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80m g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1</p>
33	XP+Trastuzumab (初回)	カハシ外注2000mg/m ² 分2をday1~14投与(2週投与1週休薬)。アプロピタクト(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38m L/kg Day1 トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):8m g/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80m g/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>
34	XP+Trastuzumab (2回目以降)	カハシ外注2000mg/m ² 分2をday1~14投与(2週投与1週休薬)。アプロピタクト(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	<p>ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10m L Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285m L/kg Day1 トラスツズマブ B S点滴静注用「ファイバー」(規格なし):6m g/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リソ酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リソ酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80m g/m² Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>