

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
210	FOLFIRI		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」（規格なし）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」（規格なし）：150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッパ <sup>®</sup> ）：1筒 Day1
220	FOLFIRI + Bevacizumab	アバスタブの投与時間は初回90分，2回目以降60分に短縮可。	1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」（規格なし）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」（規格なし）：150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-ワ」：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッパ <sup>®</sup> ）：1筒 Day1 アバスタブ点滴静注用（規格なし）：5mg/kg Day1

230	FOLFIRI + Cetuximab (1日-7日)		8	6	<p>生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッブ・フッ) :1筒 Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」 (規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m<sup>2</sup> Day8</p>
231	FOLFIRI + Cetuximab (2日-7日以降)		8	6	<p>生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッブ・フッ) :1筒 Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」 (規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

240	FOLFIRI + Panitumumab		1	13	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1  大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」（規格なし）：150mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッ°チップ°）：1筒 Day1  ベクティビックス点滴静注100mg：6mg/kg Day1</p>
250	CPT-11 + Cetuximab（1回-1日）		8	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg（リソ酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day8  大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day8  アービタックス注射液（100mg/20mL）：400mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day8  大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」（規格なし）：150mg/m<sup>2</sup> Day1  生食（100mL）：1瓶 Day8  ポラミン注5mg（1mL管）：1管 Day8  アービタックス注射液（100mg/20mL）：250mg/m<sup>2</sup> Day8</p>

251	CPT-11 + Cetuximab (2回-8回以降)		8	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 Day8  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  アーピタックス注射液 (100mg /20mL) :250mg /m<sup>2</sup> Day1 Day8  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :150mg /m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day8</p>
260	CPT-11 + Panitumumab		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  ベクティビックス点滴静注100mg:6mg /kg Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :150mg /m<sup>2</sup> Day1</p>
270	IRIS	<p>ティ-1は80mg/m<sup>2</sup>をday1~14経口  投与 (2週投与2週休業)。</p>	15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day15  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day15  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day15  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」 (規格なし) :125mg /m<sup>2</sup> Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day15</p>

280	SIR + Bevacizumab	アバスタブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。ティーエスブは80mg/m <sup>2</sup> をday1～14経口投与（2投与1休）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」（規格なし）：150mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスタブ点滴静注用（規格なし）：7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
281	CapeIRI + Bevacizumab	アバスタブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。カペシタビンは1600mg/m <sup>2</sup> /dayをday1～14経口投与（2投与1休）。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」（規格なし）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスタブ点滴静注用（規格なし）：7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
290	FOLFIRI + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ポラミン注5mg：1管 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」（規格なし）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」（規格なし）：150mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」：400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッパチップ）：1筒 Day1 大塚生食注（250mL）：1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用（規格なし）：8mg/kg Day1

300	FOLFIRI + Aflibercept		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-」 (規格なし) :180mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°フッ°) :1筒 Day1  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1  ザルトラップ点滴静注 (規格なし) :4mg/kg Day1</p>
440	FOLFOXIRI		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  プロイメンド点滴静注用150mg/瓶:1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-」 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-」 (規格なし) :165mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-」:3200mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°フッ°) :1筒 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

441	FOLFOXIRI + Bevacizumab (導入療法)	最大12コース。アバスタチンの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし) :165mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-7」:3200mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°チップ°) :1筒 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>
442	FL + Bev (維持療法)	アバスタチンの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-7」:3200mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°チップ°) :1筒 Day1  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1</p>
443	mFOLFOXIRI + Bevacizumab (導入療法)	最大12コース。アバスタチンの投与時間は初回90分,2回目以降60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-7」(規格なし) :150mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1  フルオウラシル注1000mg「ト-7」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食注シリンジ「テルモ」10mL (スリッ°チップ°) :1筒 Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  アバスタチン点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>

444	modifiedFL+ Bev (維持療法)	アバスタブの投与時間は初回90分,2回目60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  アバスタブ点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>
10	mFOLFOX6		1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1</p>
20	mFOLFOX6 + Bevacizumab	アバスタブの投与時間は初回90分, 2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」:2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1  アバスタブ点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>



30	mFOLFOX6 + Panitumumab		1	13	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1  大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1  レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：200mg/m<sup>2</sup> Day1  オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：400mg/m<sup>2</sup> Day1  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：2400mg/m<sup>2</sup> Day1  生食シリンジ「テルモ」10mL（スリッ°チツ°）：1筒 Day1  ベクティビックス点滴静注100mg：6mg/kg Day1</p>
40	FOLFOX4		2	12	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1  アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1  大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 Day2  レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：85mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day2  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：400mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2  フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：600mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2  生食（20mL）：1管 Day2</p>

50	FOLFOX4 + Bevacizumab	アバスタチンの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	2	12	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシン静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 Day2 レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：85mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：400mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「ト-7」：600mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 アバスタチン点滴静注用（規格なし）：5mg/kg Day1 生食（20mL）：1管 Day2
60	CapeOX	カペシタビンは2000mg/m <sup>2</sup> をday1の夕からday15の朝まで内服（2週投与1週休薬）。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：130mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
70	CapeOX + Bevacizumab	カペシタビンは2000mg/m <sup>2</sup> をday1の夕からday15の朝まで内服。アバスタチンは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：130mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用（規格なし）：7.5mg/kg Day1
80	SOX	ティーエスチンは80mg/m <sup>2</sup> をday1～14経口投与（2週投与1週休薬）。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）：130mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1

90	SOX + Bevacizumab	ファイスタブは80mg/m <sup>2</sup> をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。アバスタブは2回目60分, 3回目~30分に短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1
410	Cetuximab (初回)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
411	Cetuximab (2回目以降)		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
415	Cetuximab (初回) + Encorafenib±Binimetinib		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
416	Cetuximab (2回目以降) + Encorafenib±Binimetinib		1	6	生食 (100mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液 (100mg/20mL) :250mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1

420	Panitumumab		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 ペクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
421	Panitumumab(デキサートあり)		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 ペクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1
430	5FU+LV（SLV5FU2法）		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」：400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」：2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッパチップ）：1筒 Day1
431	5FU+LV（RPMI法）	11-スは、週1回、6週連続投与2週休薬。	1	6	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」（規格なし）：250mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」：600mg/m <sup>2</sup> Day1

450	FL+Bevacizumab (bolusあり)	アバスタブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし) :200m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」:400m g/m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」:2400m g/m <sup>2</sup> Day1 生食シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):5m g/kg Day1 グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1
460	Bevacizumab+経口フッ化ピリミジン系抗がん薬	アバスタブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):7.5m g/kg Day1
470	Bevacizumab+トリフルリジン/チピラシル	ロサセブは35mg/m <sup>2</sup> をday1~5,8~12まで内服。アバスタブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	15	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15 アバチン点滴静注用(規格なし):5m g/kg Day1 Day15
10	5FU+MMC+RT		32	3	生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day29 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 フルオウラシル注1000mg「ト-7」:1000m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 グラネセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day1 Day4 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day2 Day30 Day31 Day32 Day4 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day29 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day29 Day1 マイトマイシン注用10m g :10m g/m <sup>2</sup> Day29 Day1

11	5FU+MMC+RT (q4w)		4	<p> 生食 ( 1 0 0 m L ) : 1 瓶 Day1  ラクテック注 ( 5 0 0 m L ) : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4  ソルデム1輸液 ( 5 0 0 m L ) : 1 袋 Day1 Day2 Day3 Day4  フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「 ト - 7 」 : 1 0 0 0 m g / m ³ Day1 Day2 Day3 Day4  グラニセロン点滴静注液バッグ1m g / 5 0 m L 「 H K 」 : 1 袋 Day2 Day1 Day3 Day4  デキサート注射液1.65m g ( リン酸I 5 7 6 2 m g 相当 ) : 2 管 Day2 Day3 Day4  デキサート注射液6.6m g ( リン酸I 5 7 6 8 m g 相当 ) : 1 瓶 Day1  生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1 瓶 Day1  マイトマイシン注用 1 0 m g : 1 0 m g / m ³ Day1 </p>
----	------------------	--	---	---