

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
18	Ramucirumab (肝)	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ポラミン注 5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
21	Atezolizumab + Bevacizumab	テセントリクの投与時間は、2回目以降30分に短縮可。アバスタンの投与時間は、2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
10	5FU+ I-LV		1	6	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」:400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」 (規格なし) :200mg/m ² Day1
20	FEM-B		5	2	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (20mL) :15mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」:1mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 フルオロウラシル注 1000mg「ト-7」:250mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (20mL) :1管 Day1 エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」:20mg Day1 注射用水 (20mL) :1管 Day1 マイトマイシン注用 10mg :6mg Day1

15	GC		8	13	<p>ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day8 生食 (100mL):1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注0.75mg (5mL):1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注 (規格なし):25mg/m² Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8</p>
19	GEM+S1 (胆道)	S1は体表面積に基づき60, 80, 100mg/body (60mg/m ²) をday1~14経口投与 (2週投与1週休薬)。	8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8</p>
11	GEM		15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15</p>

12	GEM+S1	テーエスワは80mg/m ² をday1~14経口投与（2週投与1週休薬）。	8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m² Day1 Day8 生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8</p>
13	5FU+GEM		5	2	<p>フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:200mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）:800mg/m² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1</p>
14	FOLFIRINOX		1	13	<p>大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液（規格なし）:85mg/m² Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ワ」（規格なし）:200mg/m² Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」（規格なし）:180mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:400mg/m² Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ワ」:2400mg/m² Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL瓶）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg）（2mL管）:1瓶 Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッ°フッ°）:1筒 Day1</p>

15	nab-PTX + GEM		15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:125mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 Day15</p>
16	mFOLFIRINOX		1	13	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m² Day1 レボホリナート点滴静注用「トリー」 (規格なし) :200mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」 (規格なし) :150mg/m² Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トリー」:2400mg/m² Day1 生食シリンジ「テルモ」10mL (スリッパチップ) :1筒 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1</p>
17	IRIS	<p>ティ-1スクは80mg/m²をday1~14経口 投与 (2週投与2週休業)。</p>	15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」 (規格なし) :100mg/m² Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day15</p>

20	Nanoliposomal CPT-11+LV+5-FU	UGT1A1*6 or UGT1A1*28 の純接合体、又は UGT1A1*6 及び UGT1A1*28 のヘテロ接合体を有する患者は50mg/m ² 開始	1	13 生食（100mL）:1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg（5mL）:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リ酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 ブドウ糖注射液5%（500mL袋）:1袋 Day1 オニバイド点滴静注43mg（10mL瓶）:70mg/m ² Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-ク」（規格なし）:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注1000mg「ト-ク」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリッ°チップ°）:1筒 Day1
----	------------------------------	---	---	---