

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
25	TIP	ルート確保時、リタミン5錠内服。アプロピタン ト (day1：125mg, day2～3： 80mg) 併用。day4～フィルグラスチム併 用。	3	18	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :400m g /m ² Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イホマイド 1 g〔注射用〕:1.2 g /m ² Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注 4 0 0 m g :200m g /m ² Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 Day2 Day3 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「リキ」 (10mL) :10m L Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25m g /m ² Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン静注7% (20mL管) :2管 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :175m g /m ² Day1
21	Temsirolimus		1	6	生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 ポラミン注 5 mg:1管 Day1 生食 (2 5 0 m L) :1瓶 Day1 トーリセル点滴静注液25mg:25m g Day1
23	Nivolumab + Ipilimumab	導入療法 (3週毎の4コース) と、維持療 法 (2週毎 または 4週毎) の2段階で行 う。	1	20	生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 オプジーボ点滴静注240mg (24mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :20m L Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1m g /kg Day1

28	Avelumab+Axitinib	インライタ併用。ルート確保時、レスタミン50mg、カロナール500mg（又は同等の薬剤）を内服。	1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1
22-1	Nivolumab（q2w）		1	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：1瓶 Day1
26-1	Pembrolizumab（q3w） + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）：200mg Day1
22-2	Nivolumab（q4w）		1	27	生食（100mL）：1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg（24mL瓶）：2瓶 Day1
26-2	Pembrolizumab（q6w） + Axitinib	アキシチニブは1日2回連日経口投与。	1	41	生食（100mL）：1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg（100mg/4mL）：400mg Day1

14	BEP		15	6	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソリュージェンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (ラステット) :100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 プレオ注射用 (規格なし) :30mg/g Day1 Day8 Day15 フロセミド注20mg「トーフ」 (ラシックス) :0.5管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
19	CBDCA単剤 (セミノマI期)		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p>
10	DOC		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :70mg/m² Day1</p>

15	Cabazitaxel	投与開始日よりプレドニン10mg（1回5mg，1日2回朝と昼）連日服用。	1	20	生食（100mL）：1瓶 Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg:25mg/m ² Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1
11	GC	アピタット（day2：125mg，day3～4：80mg）併用。	8	13	ソルデム3A輸液（500mL袋）：1袋 Day3 Day4 Day2 生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day2 生食（100mL瓶）：1瓶 Day2 アロキシ静注0.75mg（5mL）：1瓶 Day2 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL管）：10mL Day2 生食（500mL）：1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注（規格なし）：70mg/m ² Day2 20%マンニトール注射液「YD」（300mL袋）：1袋 Day2
12	GEM		8	13	生食（100mL）：1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）：1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）：1000mg/m ² Day1 Day8

13	M-VAC	ア°ビ°タト (day2 : 125mg, day3,4 : 80mg) 併用。day1, 15, 22の13時, 16時, 19時, 22時に010ホ°リ5mg2錠内服	22	6	<p>ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 メイロン (7%20mL) :1管 Day1 Day15 Day22 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15 Day22 注射用メソレキセート (規格なし) :30mg/m² Day1 Day15 Day22 ラクテックG輸液 (500mL) :1袋 Day15 Day22 エクザール注射用10mg :3mg/m² Day15 Day22 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day2 Day3 Day4 ドキシソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :30mg/m² Day2 生食 (100mL) :1瓶 Day2 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day2 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day2 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day2 生食 (500mL) :1瓶 Day2 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :70mg/m² Day2 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :200mL Day2 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day2</p>
17	GEM+PTX	day1 (パ°クリタセルの投与30分前までに) リスタミン5錠内服。	8	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタセル注「ホス°ー」 (規格なし) :175mg/m² Day1</p>
18	DOC		1	20	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :70mg/m² Day1</p>

27	Avelumab	アブリブ併用一次化学療法後の維持療法。ルット確保時レスタミン50mg、カロナール500mg（又は同等の薬剤）内服。	1	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 バベンチオ点滴静注200mg(10mL/瓶):10mg/kg Day1
16-1	GEM+CBDCA（day1）	CBDCAの目標AUCは3~5で投与（レムニはAUC5で設定）腎機能障害のある患者のみ投与可。アブリブは主治医判断	8	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day1 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day1
24-1	Pembrolizumab（q3w）		1	20	生食（100mL）:1瓶 Day1 キイトルダ点滴静注100mg（100mg/4mL）:200mg Day1
16-2	GEM+CBDCA（day2）	CBDCAの目標AUCは3~5で投与（レムニはAUC5で設定）腎機能障害のある患者のみ投与可。アブリブは主治医判断	8	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day2 ブドウ糖注射液（5%100mL）:1瓶 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注液（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day2 大塚糖液5%（250mL）:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液（規格なし）:0mg/A Day2

24-2	Pembrolizumab (q6w)		1	41	生食 (100mL) :1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg (100mg/4mL) :400mg Day1
------	---------------------	--	---	----	---