

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
24	TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時，ビタミン5錠内服。アプロピタン ト (day1：125mg, day2～3： 80mg) 併用。	1	20	生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当)：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当)：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生食 (500mL)：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：180mg/m ² Day1 大塚糖液5% (250mL)：1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし)：0mg/A Day1
25	Weekly TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時，ビタミン5錠内服。デキサートは 1回目6.6mg，副作用なければ2回目 以降3.3mgに減量。	15	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当)：1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管)：1管 Day1 Day8 Day15 生食 (1000mL)：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし)：80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL)：1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし)：0mg/A Day1 Day8 Day15

26	DOC		1	27	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :70mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
53	DP (DOC+CDDP) (ショートハイドレーション)	アピタット (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	20	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :70mg/m² Day1 ソルデム1輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「リキ」(10mL) :1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :200mL Day1</p>
27-1	AP (DXR+CDDP)	アピタット (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	3	25	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :60mg/m² Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1</p>

27-2	AP (DXR+CDDP) (ショートハイドレーション)	アピタット (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。食事等通常 摂取+1000mL/dayの追加経口補給 の推奨 (day1~3)	1	27	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :60m g/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10m L Day1 20%マンニトール注射液「Y D」 (300mL袋) :200m L Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50m g/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」 (50mL瓶) :1瓶 Day1
34	GEM+DOC		8	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g/m ² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :80m g/m ² Day8
35	DXR		1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 アロキシ静注 0.75mg (5mL) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :60m g/m ² Day1 ソリュージェンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1

39	IFM			5	<p>生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン（7%20mL）：1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミデキサン注400mg：300mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド1g〔注射用〕：1.5g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
50	IFM+PTX	<p>ルート確保時，ヒスタミン5錠内服。アプロピタン ト（day1：125mg，day2～3： 80mg）併用。day4～フィルグラスチム併 用。</p>		3	<p>生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3 メイロン（7%20mL）：1管 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミデキサン注400mg：300mg/m² Day1 Day2 Day3 イホマイド1g〔注射用〕：1.6g/m² Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）：1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）：1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg）（2mL管）：2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg）（0.5mL管）：2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」（20mL管）：1管 Day1 生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」（規格なし）：135mg/m² Day1</p>

28	TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時、ビタミン5錠内服。アプロピタド [®] (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管) : 1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」 : 1袋 Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) : 180mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1</p>
29	Weekly TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時、ビタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」 : 1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管) : 1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL) : 1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) : 80mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1 Day8 Day15</p>
30	Weekly CPT-11		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 イリリテカン塩酸塩点滴静注液「トリー」 (規格なし) : 100mg/m² Day1 Day8 Day15</p>

31	CPT-11+MMC		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(20mL):1管 Day1 マイトマイシン注用10mg:10mg/m² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリテカン塩酸塩点静注液「トリ」(規格なし):100mg/m² Day1 Day8 Day15</p>
32	NDP	アピタット(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	27	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):80mg/m² Day1 ソリュージェンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1</p>
36	CBDCA+RT		1	6	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg(5mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1</p>

40	CPT-11 + NDP	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	8	13 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60mg/g/m ² Day1 Day8 アクブラ静注用 (規格なし) :80mg/g/m ² Day1 ソリュージェンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day8
45	NDP + RT	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	6 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 アクブラ静注用 (規格なし) :30mg/g/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1

47	TP (PTX+CDDP) + Bevacizumab	ルート確保時、リタミン5錠内服。アプロビタクト併用。アバスタンは初回90分、2回目60分、3回目～30分で投与可。	3	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキン静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :175mg/m² Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p>
48	CDDP+Topotecan	アプロビタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	3	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキン静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 ハイカムチン注射用 1.1mg :0.75mg/m² Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day2 Day3</p>

49	TC (PTX+ CBDCA) + Bevacizumab	ルート確保時、ビタミン5錠内服。アプロピタット併用。アバスタンは初回90分、2回目60分、3回目～30分で投与可。	1	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管) : 1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) : 175mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0mg/A Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用(規格なし) : 15mg/kg Day1</p>
33-1	CDDP+RT	アプロピタット (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	6	<p>ラクテック注 (500mL) : 1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL) : 1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 40mg/m² Day1 生食 (100mL) : 1瓶 Day1 フロセミド注20mg「トローワ」(ラシックス) : 1管 Day1 ソリュージェンG注500mLソフトバッグ: 1袋 Day1</p>
33-2	CDDP+RT (ショートハイドレーション)	アプロピタット (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取 + 1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1-3)	1	6	<p>生食 (100mL瓶) : 1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) : 2管 Day1 大塚生食注(250mL) : 1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) : 1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) : 10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) : 200mL Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) : 40mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) : 1瓶 Day1</p>

46-1	TP (PTX+CDDP) (day 1 のみ)	ルート確保時, リスタミン5錠内服。アプロピタット併用。	3	18	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキシン静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :175mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :1袋 Day1
46-2	TP (PTX+CDDP) (ショートハイドレーション)	アプロピタット (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨 (day1~3)	1	27	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :175mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋) :200mL Day1 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :50mg/m ² Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1

10	TC (PTX+ CBDCA)	ルート確保時, リタミン5錠内服。アプロピタン ト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。	1	20 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) : 2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管): 1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 生食 (5 0 0 m L) : 1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) : 175m g / m ² Day1 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0m g / A Day1
11	Weekly TC ①(PTX,CBDCA共にWeekly)	ルート確保時, リタミン5錠内服。デキサートは 1回目6.6mg, 副作用なければ2回目 以降3.3mgに減量。	15	13 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管): 1管 Day1 Day8 Day15 生食 (1 0 0 m L) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL): 1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) : 80m g / m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L : 1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) : 1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) : 0m g / A Day1 Day8 Day15

12	Weekly TC ②(PTXのみWeekly)	ルート確保時、リタミン5錠内服。アプロピタン ト (day1 : 125mg, day2~3 : 80mg) 併用。デキサートは2回目以降 3.3mgに減量可	15	6	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1
13	Bi-Weekly PTX	ルート確保時、リタミン5錠内服。デキサートは 1回目6.6mg, 副作用なければ2回目 以降3.3mgに減量。	1	13	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食 (100mL) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
14	DOC		1	27	グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし) :70mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1

16	Weekly CPT-11		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) : 100mg/m² Day1 Day8 Day15</p>
17	CPT-11+MMC		15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 生食 (20mL) : 1管 Day1 マイトマイシン注用10mg : 10mg/m² Day1 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) : 100mg/m² Day1 Day8 Day15</p>
18	CPT-11+DOC	ア°ビ°タト (day8 : 125mg, day9 ~10 : 80mg) 併用。	8	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL : 1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注0.75mg (5mL) : 1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) : 1瓶 Day1 Day8 生食 (500mL) : 1瓶 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) : 60mg/m² Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」: 1袋 Day8 大塚生食注(250mL): 1袋 Day8 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) : 60mg/m² Day8</p>

19	Liposomal DXR		1	27	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドキシル注 20mg:40mg/g/m² Day1 ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1</p>
20	CPT-11+CDDP	アプレタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	15	13	<p>生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg (5mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」 (規格なし) :60mg/g/m² Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :60mg/g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day15 アロキシ静注0.75mg (5mL) :1瓶 Day8 Day15 ソルデム3A輸液 (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL (20mL管) :10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL袋) :1袋 Day1</p>
21	DC (DOC+CBDCA)	カルボプラチンの投与量 (範囲) は, AUC5~6 (レンジはAUC6で設定)。アプレタクト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」 (規格なし) :70mg/g/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p>

22	Liposomal DXR + CBDCA	アピタント (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	1	27	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 ドキシル注 2 0 mg:30m g/m Day1 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0m g/A Day1</p>
23	GEM		15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000m g/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
37	Topotecan		5	16	<p>生理食塩液「ヒカリ」5 0 m L :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (1 0 0 m L) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1. 1 m g :1.25m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>

38	GEM+ CBDCA	アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 100mL) :1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1</p>
43	TC (PTX+ CBDCA) + Bevacizumab	ルート確保時, リタミン5錠内服。アプロタクト併用。アバスタブは初回90分, 2回目60分, 3回目~30分で投与可。	1	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食 (500mL) :1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」 (規格なし) :175mg/m² Day1 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg/A Day1 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p>
44	Bevacizumab維持療法	アバスタブの投与時間は30分まで短縮可。	1	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 生食 (1000mL) :1瓶 Day1 アバスタブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p>

46	Weekly TC (PTX+CBDC) + Bevacizumab	<p>ルート確保時, リタミン5錠内服。アプロタクト (day1 : 125mg, day2,3 : 80mg) 併用。デキサートは2回目以降3.3mgに減量可</p>	15	<p>6 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし) :80mg /m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :0mg /A Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg /kg Day1</p>
10	BEP	<p>アプロタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。必要によりday4~5 (80mg) まで追加可能。</p>	16	<p>5 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注 (規格なし) :20mg /m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソリューゲンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :100mg /m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL) :1瓶 Day2 Day9 Day16 プレオ注射用 (規格なし) :20mg /m² Day2 Day9 Day16 フロセミド注20mg「トロー」(ラシックス) :0.5管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラクテック注 (500mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>