

レジメン一覧					2021/08/12 時点
コード	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
10	Rituximab 100mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠と和パ°タジン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：90mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：100mg Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1
11	Rituximab 400mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠と和パ°タジン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：360mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：400mg Day1
12	Rituximab 500mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠と和パ°タジン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：450mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：500mg Day1
13	Rituximab 600mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠と和パ°タジン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1
14	Rituximab 700mg/body	リツキサブ投与開始30分前に、ロキソニンNa60mg1錠と和パ°タジン5mg1錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（100mL）：90mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：100mg Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1

15	Rituximab 800mg/body	リツキサンの投与開始30分前に、0.75mg/kgのNa60mg錠と和ハチン5mg錠内服。	1	0	生食（100mL）：1瓶 Day1 生食（200mL瓶）：180mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：200mg Day1 生食（500mL）：500mL Day1 生食（20mL）：40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」（規格なし）：600mg Day1
16	CHOP	day1～5にプレドニンを100mg/日内服を併用。アプロピット併用は主治医判断。投与間隔は3週毎。	1	19	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オンコビン注射用 1mg：1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg：750mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用（規格なし）：50mg/m <sup>2</sup> Day1
17	Bi-Weekly CHOP	day1～5にプレドニンを100mg/日内服を併用。アプロピット併用は主治医判断。投与間隔は2週毎。G-CSFによるフォロー必要	1	12	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL：1瓶 Day1 オンコビン注射用 1mg：1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(250mL)：1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg：750mg/m <sup>2</sup> Day1 ソルデム3A輸液（500mL）：1袋 Day1 生食（100mL）：1瓶 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射用（規格なし）：50mg/m <sup>2</sup> Day1

19	CCD		3	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし) :25mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  生食 (500mL) :1瓶 Day1  カルボプラチン点滴静注液 (規格なし) :250mg/g/m<sup>2</sup> Day1</p>
20	CMD		3	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day2 Day3  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし) :25mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day2  大塚生食注(250mL):1袋 Day3  ノバントロン注10mg (5mL瓶) :8mg/g/m<sup>2</sup> Day3</p>
21	Bendamustine		2	19	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg相当) :2管 Day1 Day2  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2  トリアキシン点滴静注液100mg (4mL瓶) :120mg/g/m<sup>2</sup> Day1 Day2</p>

22	ABVD	主治医判断でアプロピタト (day1~3, 15~17) 併用。	15	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15  プレオ注射用 (規格なし) :10mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15  エクザール注射用10mg :6mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15  ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15  ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15  注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day15  ダカルバジン注用100 :375mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15</p>
23	AMP		1	13	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :30mg/m<sup>2</sup> Day1  注射用サイメリン50mg:60mg/m<sup>2</sup> Day1  水溶性プレドニン (規格なし) :40mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1</p>
24	EPOCH	day1~5のフルトニン (60mg/m <sup>2</sup> ) 経口併用可。	5	16	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day5 Day1 Day2 Day3 Day4  生食 (500mL) :1瓶 Day5  注射用エンドキサン500mg:750mg/m<sup>2</sup> Day5  生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  オンコピン注射用1mg:0.4mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :10mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  イトポシド点滴静注液100mg「サト」 (5mL瓶) :50mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4</p>

25	VECP	day2, 3のプレドニンは経口投与。	3	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1  注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m<sup>2</sup> Day1  ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  生食(500mL):1瓶 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m<sup>2</sup> Day1  水溶性プレドニン50mg:50mg Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
26	VCAP-AMP-VECP	day2~6, 9~13, 18~27にG-CSF投与。day16, 17のプレドニンは経口投与。	17	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17  生食(1000mL):1瓶 Day1 Day8  オンコピン注射用1mg:1mg/m<sup>2</sup> Day1  ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  注射用エンドキサソ500mg:350mg/m<sup>2</sup> Day1  水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m<sup>2</sup> Day8  注射用サイメリン50mg:60mg/m<sup>2</sup> Day8  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 Day16 Day17  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day15  注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m<sup>2</sup> Day15  ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day15 Day16 Day17  エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m<sup>2</sup> Day15 Day16 Day17  生食(500mL):1瓶 Day15  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m<sup>2</sup> Day15</p>

27	MPV	塩酸プロカルバジン（100mg/m <sup>2</sup> /dayを2-3分割）は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	5	8	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          ロイコリン注3mg（1mL管）:15m g /m<sup>2</sup> Day2 Day4 Day5 Day3          生食（500mL瓶）:1瓶 Day1          メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:3500m g /m<sup>2</sup> Day1          生理食塩液「ヒカリ」（50mL瓶）:1瓶 Day1          オンコピン注射用1mg/瓶:1.4m g /m<sup>2</sup> Day1</p>
48	GDP		8	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day8          デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:5瓶 Day1 Day2 Day3          生食（500mL）:1瓶 Day1 Day2 Day3          シスプラチン点滴静注（規格なし）:25m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3          生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8          ゲムシタピン点滴静注液（規格なし）:1000m g /m<sup>2</sup> Day1 Day8          生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8          デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:1瓶 Day8</p>

49	DeVIC	放射線療法と同時に実施する場合は、 2/3量に減量。	3	18	<p>生食（500mL瓶）：1瓶 Day1 Day2 Day3          グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3          デキサート注射液6.6mg（リ酸エステル8mg相当）：5瓶 Day1 Day2 Day3          生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3          ウロミテキサン注400mg：1管 Day1 Day2 Day3          生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3          イホマイド1g〔注射用〕：1.5g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3          ブドウ糖注射液（5%500mL）：1袋 Day1 Day2 Day3          エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）：100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3          大塚糖液5%（250mL）：1袋 Day1          カルボプラチン点滴静注液（規格なし）：300mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
50	MINE		3	18	<p>生食（100mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3          ノバントロン注10mg（5mL瓶）：8mg/m<sup>2</sup> Day1          グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」：1袋 Day1 Day2 Day3          ウロミテキサン注400mg：1管 Day1 Day2 Day3          生食（500mL）：1瓶 Day1 Day2 Day3          イホマイド1g〔注射用〕：1.33g/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3          ブドウ糖注射液5%（500mL袋）：1袋 Day1 Day2 Day3          エトポシド点滴静注液100mg「サンド」（ラステット）：65mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p>

51	THP-COP	フルオロウラシル30mg/m <sup>2</sup> /日を3～5日間経口投与。	1	19	<p>大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1            グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1            生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1            オンコピン注射用 1mg:1mg/m<sup>2</sup> Day1            ブドウ糖注射液 (5%100mL) :1瓶 Day1            注射用テラルピシン (規格なし) :30mg/m<sup>2</sup> Day1            大塚生食注(250mL):1袋 Day1            注射用エンドキサソ 500mg:500mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
52	Gemcitabine		15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15            デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day8 Day15            生食 (100mL) :1瓶 Day8 Day15            ゲムシタピン点滴静注液 (規格なし) :1000mg/m<sup>2</sup> Day8 Day15            生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day8 Day15</p>
53	CHASE	イントロニ開始6時間前～終了24時間後までメイロンを含む80mL/時以上の補液が必要。	3	18	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3            デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3            生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3            注射用エンドキサソ 500mg:1200mg/m<sup>2</sup> Day1            エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット) :100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3            大塚生食注(250mL):1袋 Day2 Day3            キロサイドN注400mg:2000mg/m<sup>2</sup> Day2 Day3</p>



54	DHAP		4	17	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  デキセート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  大塚生食注(250mL):1袋 Day2  キロサイドN注400mg:2000mg/m<sup>2</sup> Day2  ヒトコルチゾン酢酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」:1瓶 Day2</p>
55	ESHAP		5	23	<p>生食 (1000mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ソル・メドロール静注用500mg (溶解液8mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  シスプラチン点滴静注 (規格なし) :25mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  大塚糖液5% (250mL) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (ラステット) :40mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  大塚生食注(250mL):1袋 Day5  キロサイドN注400mg:2000mg/m<sup>2</sup> Day5</p>
56	MTX大量		5	9	<p>生食 (500mL) :1瓶 Day1  メソトレキセート点滴静注液200mg (8mL瓶) :3500mg/m<sup>2</sup> Day1  ロイコボリン注3mg (1mL) :15mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1</p>

58	CPT-11	1週毎に2〜3回繰り返す、少なくとも2週間休薬する。	3	4	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3  イリテカン塩酸塩点滴静注液「トワ」(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p>
59	M-FEPA	MTXの投与に際して、Ccr 60mL/min以上であることを確認。	3	4	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3  メイロン (7%20mL):1管 Day1 Day2 Day3  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  生食 (20mL):1管 Day1  注射用メソトレキセート50mg:100mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (500mL):1瓶 Day1  注射用メソトレキセート50mg:300mg/m<sup>2</sup> Day1  ロイコポリン注3mg (1mL):5管 Day2 Day3</p>
60	大量Ara-C (PCNSL)	2コースの地固め療法として行う。	2	26	<p>生食 (500mL瓶):1瓶 Day2 Day1  キロサイドN注400mg:3000mg/m<sup>2</sup> Day2 Day1  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管):1瓶 Day1 Day2</p>

64	Pralatrexate	投与10日以上前から葉酸 1.0～1.25mg 内服、VB12 1mg 筋注。週1回投与を6週連続で行い、7週目は休薬する。	15	6	<p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>ジフォルタ注射液20mg (1mL瓶) :30mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15</p>
66	Obinutuzumab + Bendamustine (初回)	ガザイバ投与開始30分前に、加ナール500mg2錠とヒスタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	15	13	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day3 Day2 Day8 Day15</p> <p>ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day15 Day3 Day2</p> <p>ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day8 Day15</p> <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2</p> <p>デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2</p> <p>トリアキシン点滴静注液100mg (4mL瓶) :90mg/m<sup>2</sup> Day3 Day2</p>
67	Obinutuzumab + Bendamustine (2回目以降)	ガザイバ投与開始30分前に、加ナール500mg2錠とヒスタミン10mg5錠内服。6コース終了後、維持療法を行う。	3	25	<p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day3 Day2</p> <p>ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1</p> <p>グラニセトン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2</p> <p>デキサート注射液1.65mg (リソ酸エステル2mg相当) :2管 Day3 Day2</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day3 Day1 Day2</p> <p>トリアキシン点滴静注液100mg (4mL瓶) :90mg/m<sup>2</sup> Day3 Day2</p> <p>ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1</p>

68	Obinutuzumab (維持)	ガザイバ投与開始30分前に、加ナル500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。維持療法は2ヶ月毎に2年間行う。	1	55	生食 (100mL) :1瓶 Day1 ソル・メドロール静注用40mg (溶解液1mL) :2瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg/40mL) :1瓶 Day1
57-1	Brentuximab Vedotin (<50mg)	アドセトリブの投与量によってレジメを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :1管 Day1 アドセトリブ点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1
57-2	Brentuximab Vedotin (≥50mg)	アドセトリブの投与量によってレジメを選択する。	1	20	生食 (100mL) :1瓶 Day1 注射用水 (20mL管) :2管 Day1 アドセトリブ点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1

79-1	BV+AVd (BV < 50mg)	アプロピタト (day1~3, 15~17) は主治医判断。最大6コース。アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	15	13	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15          生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15          エクザール注射用10mg :6mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15          ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15          注射用水 (20mL管) :3管 Day1 Day15          ダカルバジン注用100 :250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶) :1瓶 Day1          注射用水 (20mL管) :1管 Day1          アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15          生食 (100mL瓶) :1瓶 Day15          注射用水 (20mL管) :2管 Day15</p>
79-2	BV+AVd (BV ≥ 50mg)	アプロピタト (day1~3, 15~17) は主治医判断。最大6コース。アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	15	13	<p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15          グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15          デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day15          生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day15          エクザール注射用10mg :6mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day15          ドキソルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :25mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day15          注射用水 (20mL管) :3管 Day1 Day15          ダカルバジン注用100 :250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day15          生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day15          注射用水 (20mL管) :2管 Day1 Day15          アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15</p>

34	ALL-97変法	day1~7のフルドニオン (60mg/m <sup>2</sup> ) は経口投与。	22	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生食 (500mL) :1瓶 Day1  注射用エンドキサン500mg:800mg/m<sup>2</sup> Day1  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 Day22  ダウノマイシン (20mg) :30mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22</p>
35	MAVP (地固め療法)	day2~4のフルドニオン (60mg/m <sup>2</sup> ) は経口投与。	4	24	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2  生食 (500mL) :1瓶 Day1  注射用メソトレキセート (規格なし) :500mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day2  ドキシルビシン塩酸塩注射用 (規格なし) :45mg/m<sup>2</sup> Day2  オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m<sup>2</sup> Day2  生食 (20mL) :1管 Day2 Day3 Day4  ロイコポリン注 3mg (1mL) :15mg/m<sup>2</sup> Day2 Day3 Day4</p>
78	Ph+ALL208IMA 寛解導入療法	day1-21 PSL 60mg/m <sup>2</sup> , day8-42 Imatinib 600mg。アブリティオ。60歳以上 : CY 800mg/m <sup>2</sup> ,DNR 30mg/m <sup>2</sup> ,PSL day1-7	22	20	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3  オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3  ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1  注射用エンドキサン500mg:1200mg/m<sup>2</sup> Day1</p>

80	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C1	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。 day4-21 Imatinib 600mg。アゾピタ ント、ステロイド点眼要。60歳以上：Ara-C 1,000mg/m <sup>2</sup>	4	24	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食（500mL瓶）:1瓶 Day2 Day3 Day1 キロサイドN注400mg（20mL管）:2000mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用40mg（溶解液1mL）:50mg Day1 Day2 Day3 ロイコリン注3mg（1mL管）:15mg Day3 Day4 Day2 ムントレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:900mg/m <sup>2</sup> Day1 ムントレキセート点滴静注液200mg（8mL瓶）:100mg/m <sup>2</sup> Day1
81	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C2	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。 day1-7 PSL 60mg/m <sup>2</sup> 、day2-21 Imatinib 600mg。アゾピタ ント。C1→ C2を4回繰り返す	1	27	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 生食（100mL）:1瓶 Day1 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m <sup>2</sup> Day1 生食（500mL瓶）:1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m <sup>2</sup> Day1
82	Ph+ALL208IMA 維持療法	day1-5 PSL 60mg/m <sup>2</sup> 、day1-28 Imatinib 600mg。寛解到達後2年 目まで4週ごとに継続する。	1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 生食（100mL瓶）:1瓶 Day1

28	DA (寛解導入療法)	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	7	21	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>ダウノマイシン (20mg) :50mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p> <p>キロサイド注 (規格なし) :100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
29	MA (地固め療法)		5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day4 Day5 Day1 Day2 Day3</p> <p>キロサイド注 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day4 Day5 Day1 Day2 Day3</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3</p> <p>ノバントロン注10mg (5mL瓶) :7mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p>
30	DA (地固め療法)	アピタクト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL〔HK〕:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3</p> <p>ダウノマイシン (20mg) :50mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p> <p>生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p> <p>キロサイド注 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1 Day4 Day5 Day2 Day3</p>



31	AA (地固め療法)	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	23	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  キロサイド注 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  アクラシノン注射用20mg:20mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
32	AVVV (地固め療法)	アピタト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	10	18	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  キロサイド注 (規格なし) :200mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ブドウ糖注射液5% (500mL袋) :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (ラステット) :100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生食 (20mL) :1管 Day8 Day10  オンコピン注射用1mg:0.8mg/m<sup>2</sup> Day8  注射用フィルデシン (規格なし) :2mg/m<sup>2</sup> Day10</p>
33	CAG	day1~28にG-CSF投与。65歳以上はアクリノ10mg/m <sup>2</sup> 。	14	14	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4  キロサイド注 (規格なし) :20mg/m<sup>2</sup> Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4  生食 (100mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  アクラシノン注射用20mg:14mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4</p>

65	IDR+AraC	ア°ビ°タト (day1 : 125mg, day2 ~3 : 80mg) 併用。	5	16	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当) :1瓶 Day1 Day2 Day3  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 Day2 Day3  注射用水 (20mL管) :1管 Day1 Day2 Day3  イダマイン静注用5mg/瓶:12m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  生食 (500mL) :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  キロサイド注 (規格なし) :140m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
38	(SC) Azacitidine (day1~7)		7	21	<p>注射用水 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  ビダーザ注射用100mg:75m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
39	(SC) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	<p>注射用水 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9  ビダーザ注射用100mg:75m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9</p>
40	(DIV) Azacitidine (day1~7)		7	21	<p>生食 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  生理食塩液「ヒカリ」500mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  注射用水 (20mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7  ビダーザ注射用100mg:75m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>

41	(DIV) Azacitidine (day1~5, 8~9)		9	19	<p>生食 (20 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9          生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9          注射用水 (20 mL) :1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9          ビダーザ注射用100mg:75mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9</p>
42	Mogamulizumab	必要により解熱鎮痛剤 (アセトアミノフェン等) の前投与を行う。週1回 (化学療法併用の場合, 2週に1回), 8回投与。	1	0	<p>生食 (100 mL) :1瓶 Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          ポテリジオ点滴静注20mg:1mg/kg Day1          生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1          デキサート注射液6.6mg (リソ酸エステル8mg) (2mL管) :1瓶 Day1          ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1</p>
45	VCAP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          生食 (100 mL) :1瓶 Day1          オンコピン注射用 1mg:1mg/m<sup>2</sup> Day1          ドキソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :40mg/m<sup>2</sup> Day1          大塚生食注(250mL):1袋 Day1          注射用エンドキサン500mg:350mg/m<sup>2</sup> Day1          水溶性プレドニン (規格なし) :40mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
46	AMP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1          生食 (100 mL) :1瓶 Day1          ドキソルピシン塩酸塩注射用 (規格なし) :30mg/m<sup>2</sup> Day1          注射用サイメリン50mg:60mg/m<sup>2</sup> Day1          水溶性プレドニン (規格なし) :40mg/m<sup>2</sup> Day1          生理食塩液「ヒカリ」50 mL :1瓶 Day1</p>

47	VECP	day4~13にG-CSF投与。day2, 3のプレドニンは経口投与。	3	11	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1  注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m<sup>2</sup> Day1  ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3  生食(500mL):1瓶 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m<sup>2</sup> Day1  水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
60	CDDP (10mg) + CPT-11 (20mg)		3	1	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3  イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トリ」:20mg Day1 Day2 Day3  生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3  シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:10mg Day1 Day2 Day3  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
63	CDDP (20mg) + CPT-11 (40mg)		3	1	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3  イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トリ」:40mg Day1 Day2 Day3  生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3  シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:20mg Day1 Day2 Day3  グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>

36	(IV) Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12はテ`カ`の` 10mg/body経口投与。	11	10	生食（100mL）:1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）:2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食（20mL）:1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11
37	(IV) Bortezomib（維持）±Dexamethasone	day2, 9, 16, 23はテ`カ`の` 10mg/body経口投与。	22	13	生食（100mL）:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:2瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）:2管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食（20mL）:1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22
43	(SC) Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12はテ`カ`の` 10mg/body経口投与。	11	10	生食（100mL）:1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg（リン酸エステル8mg相当）:2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg（リン酸エステル2mg相当）:2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食（20mL）:1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11
53	(SC) Bortezomib（維持）	副腎皮質ステロイド（リテ`ック等）を適宜併用。	22	13	生食（20mL）:1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22

61	Elotuzumab (1, 2コース目)	加ナル500mg 1錠, リスタミン10mg 3錠 内服。ゾラミド、レテックス併用。	22	6	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注(250mL):230m L Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水(20mL管):2管 Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22
62	Elotuzumab (3コース目以降)	加ナル500mg 1錠, リスタミン10mg 3錠 内服。ゾラミド、レテックス併用。	15	13	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):230m L Day1 Day15 注射用水(20mL管):2管 Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day15
69	DLd (1, 2コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。ゾラミド 3週投与、1週休薬。	22	6	生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg)(2mL管):5瓶 Day8 Day15 Day22 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day8 Day15 Day22 生食(500mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day8 Day15 Day22 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1

70	DLd (3~6コース目)	day1,15 加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レパミト 3週投与、1週休薬。day8,22 レパミトックス40mg内服。	15	13	生食 (100mL瓶) :1瓶 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day15 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day15 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day15
71	DLd (7コース目~)	day1 加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠内服。レパミト 3週投与、1週休薬。day8,15,22 レパミトックス40mg内服。	1	27	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :5瓶 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
72	DMPB (1コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナル500mg 2T,モンテカスト10mg 1T。 day1-4 アルケラン 9mg/m <sup>2</sup> ,day2-4 プレドニソロン 60mg/m <sup>2</sup> 。	36	6	生食 (20mL管) :1管 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m <sup>2</sup> Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16mg/kg Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1

73	DMPB (2~9コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、加ナル500mg 2T、モンテカスト10mg 1T。 day1-4 アルケラン 9mg/m <sup>2</sup> , day2-4 プレトニン 60mg/m <sup>2</sup> 。	29	13	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day22 Day29 Day1 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3m g /m <sup>2</sup> Day8 Day22 Day29 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day22 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day22 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day22 Day1 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day22 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day1
74	DMPB (10コース目~)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。	1	27	生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1
75	DBd (1~3コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナル500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。 day2, 9 レナテックス 20mg 内服。	15	6	生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3m g /m <sup>2</sup> Day8 Day1 生食 (100mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day8 Day15 ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day8 Day15 生食 (500mL瓶) :1瓶 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g /kg Day8 Day15 テルモ生食 (1000mL) :1袋 Day1



76	DBd (4~8コース目)	<p>ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナール500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。day2, 8, 9 レナデックス 20mg 内服。</p>	8	13	<p>生食 (20mL管) :1管 Day8 Day1  ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3m g /m<sup>2</sup> Day8 Day1  生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1  ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1</p>
77	DBd (9コース目~)	<p>ダラザレックス投与開始1-3時間前に、加ナール500mg 2錠、モンテカスト10mg 1錠 内服。</p>	1	20	<p>生食 (500mL瓶) :1瓶 Day1  ダラザレックス点滴静注 (規格なし) :16m g/kg Day1  生食 (100mL瓶) :1瓶 Day1  デキサート注射液6.6mg (リン酸エステル8mg) (2mL管) :2瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg (リン酸エステル2mg) (0.5mL管) :2管 Day1  ポラミン注5mg (1mL管) :1管 Day1</p>